

BODNUTIE HMYZOM

Hoci je bodnutie hmyzom, napr. včelou, osou, sršňom, bolestivé, väčšinou nevyžaduje lekárske ošetrenie. Nebezpečenstvo hrozí deťom, ktoré sú na bodnutie hmyzom alergické, to môže u nich vyvolať anafylaktický šok.

Taktiež vysoko nebezpečné je bodnutie v ústach a v hrdle, kde opuch môže spôsobiť udusenie.

Príznaky závažnej alergickej reakcie:

- opuch iváre či ústnej dutiny,
- ťažkosti s prehĺtaním alebo s hovorením,
- ťažkosti s dýchaním, písanie pri dýchaní,
- bolesti brucha, napínanie na zvracanie, zvracanie, hnačka,
- závrte, mdloby, bezvedomie.



Kontaktuje pohotovosť, ak:

- !! dieťa má akýkoľvek príznak závažnej alergickej reakcie,
- !! je bodnutie ústach a v hrdle (dajte dieťaťu cmúľať ľad alebo ho nechajte vyplachovať ústa studenou vodou),
- !! sa v minulosti objavila závažná alergická reakcia na bodnutie hmyzom.

ČO ROBIŤ?

Ak má dieťa príznaky závažnej alergickej reakcie, volajte pohotovosť!



Ak dieťa nemá príznaky závažnej reakcie:

1. Odstráňte žihadlo, ak ešte ostalo zapichnuté v koži, zachytíte ho pinzetou a vytiahnite ho. Pozor, jedový váčok nestlačte, aby ste zvyšok jedu nevyliačili do kože.
2. Na zmiernenie bolesti a opuchu priložte studený obklad, lekársky lieh alebo roztok sódy bikarbóny (1 čajová lyžička na pohár vody).

Myslite na prevenciu!

Dieťa by nemalo:

- chodiť bosé po tráve,
- používať výrazne parfumovanú kozmetiku,
- nosiť pestré oblečenie s kvetovanou potlačou,
- piť nápoje z plechoviek,
- konzumovať vonku jedlo bez zvýšenej opatrnosti,
- zdržiavať sa v miestach, kde má bodavý hmyz hniezdo.

Upozornenie: Všetky informácie tu obsiahnuté sú len na vzdelávacie účely. Nenahrádzajú konzultáciu s lekárom. S diagnostikou, liečbou a odborným poradenstvom sa obráťte na svojho detského lekára.