

Febrilné kŕče

Aj keď pôsobia kŕče hrozivo, väčšinou trvajú len niekoľko minút a odoznejú spontánne. Takmer nikdy neohrozujú život. Sú spojené s horúčkou. Zvyknú sa vyskytovať u malých detí, väčšinou nie sú závažné a nespôsobujú trvalé poškodenie.



Príznaky

1. Dieťa má horúčku, potí sa.
2. Svaly tváre a končatín sa občas mykajú.
3. Dieťa chvíľami škúli a prevracia oči.
4. Môže stmúť a stuhnúť so zaklonenou hlavou a prehnutým chrbtom.
5. Môže zadržiavať dych, pričom môže zmodrieť.
6. Tvár a krk môžu opuchnúť.
7. V ústach sa môže objaviť pena.
8. Môže sa svojvoľne pomočiť.

Kontaktujte pohotovosť, ak:

- o kŕče trvajú viac ako 5 minút alebo sa kŕčovité záchvaty opakujú,
- o dieťa má ťažkosti s dýchaním,
- o má modré pery, jazyk či tvár,
- o nie je pri vedomí po odoznení kŕčovitého záchvatu,
- o dieťa si počas kŕčov udrelo hlavu,
- o má akékoľvek iné príznaky, ktoré vás znepokojujú.

Čo robiť?

1. Zachovajte klud.
2. Opatrne uložte dieťa na podložku a z okolia odstráňte predmety, aby sa neporanilo.
3. Dieťaťu uvoľnite odev na krku a hrudníku.
4. Zabezpečte prístup čerstvého vzduchu.
5. Dieťa ochladíte odkrytím alebo vyzlečením.
6. Nedávajte dieťaťu nič piť ani jesť počas záchvatu.
7. Kontaktujte lekára.

MYSLE NA PREVENCIU!

Ak vaše dieťa malo v minulosti kŕče, dbajte o to, aby dostalo liek, ako mu bolo lekárom predpísané.

Upozornenie: Všetky informácie tu obsiahnuté sú len na vzdelávacie účely. Nenahrádzajú konzultáciu s lekárom. S diagnostikou, liečbou a odborným poradenstvom sa obráťte na svojho detského lekára.