

## **Povinné očkovanie**

### **Hexavakcína - šesťzložková vakcína ( vakcína Hexacima, Infanrix Hexa.....)**

Očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, žltáčke typu B, hemofilu influenzae typu B

Základné očkovanie - 3 dávky

1.dávka - tretí mesiac

2.dávka - piaty mesiac

3. dávka - jedenásty mesiac

### **Očkovanie proti pneumokokom**

3 dávky

1.dávka - tretí mesiac

2.dávka - piaty mesiac

3. dávka - jedenásty mesiac

2 druhy vakcín

**SYNFLORIX** vakcína- ochrana pred 10 najčastejším pôvodcom závažných pneumokokových ochorení

**PREVENAR 13** vakcína - ochrana pred 13 najčastejším pôvodcom závažných pneumokokových ochorení

### **Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole (vakcína M-M-RvaxPro, Priorix....)**

1.dávka - medzi 15-18 mesiacom

2.dávka - v štvrtom roku života ( deti narodené od r. 2016)

2.dávka - v desiatom roku života ( deti narodené do r. 2016)

### **Očkovanie proti záškrtu, tetanu čiernemu kašľu a detskej obrne - preočkovanie**

4. dávka - v piatom roku života ( vakcína Tetraxim, Infanrix Polio....)

5. dávka - v dvanástom roku života ( vakcína Boostrix Polio...)

## **Dobrovoľné očkovanie.**

### **Očkovanie proti rotavírusovej hnačke - perorálna vakcína( vakcína Rotarix .....**

Pre deti do 6 mesiacov

1. dávka 10 ty týždeň života

2. dávka tretí mesiac života spolu s hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokom

Je možná aj iná očkovacia schéma

Očkovanie hradí zdravotná poisťovňa

### **Očkovanie proti ovčím kiahňam (vakcína Varivax....)**

Očkovanie pre všetky deti aj dospelých ktorí neprekonali ovčie kiahne

Odporúčené 2 dávky s odstupom minimálne 2 mesiace. Preočkovanie nebolo stanovené.

Očkovať je možné počas celého roka

Očkovanie hradí pacient

### **Očkovanie proti žltáčke typu A ( vakcína Havrix, Vaqta....)**

Očkovanie pre deti aj dospelých. Základne očkovanie pozostáva z 2 dávok s odstupom 6-10 mesiacov. Preočkovanie nebolo stanovené. Očkovať je možné počas celého roka.

Očkovanie hradí pacient.

### **Očkovanie proti meningokokom**

Meningokoky spôsobujú závažný bakteriálny zápal mozgových blán s rýchlym priebehom.

Najrizikovejšia veková kategória sú deti od 0 do 6 rokov a deti od 13 rokov , dospelávajúci až

mladí dospelí. Očkovanie je vhodné aj pre deti vo veku 6 až 13 rokov a tiež pre osoby v dospelom veku.

### **Meningokok typ B ( vakcína Bexsero) - najčastejší výskyt v našich zemepisných šírkach**

Deti do dvoch rokov života 3 dávky

Deti od dvoch rokov a dospelí 2 dávky

Booster - posilňovacia dávka nebola stanovená.

V rámci zabezpečenia ochrany u detí v najrizikovejšej vekovej kategórii odporúčame začať očkovanie detí v siedmom mesiaci života, po podaní prvých dvoch dávok očkovania hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokom.

Očkovanie hradí pacient

### **Meningokok typ A, C, W, Y ( vakcína Nimenrix)**

Od 12 mesiacov 1 dávka

Očkovanie je možné počas celého roka.

Očkovanie hradí pacient.

### **Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde ( vakcína FSME)**

Pre deti od jedného roka a dospelých.

Základné očkovanie - 3 dávky

Obvyklá schéma: 2. dávka sa podáva po 1 - 3 mesiacoch po 1. očkovaní a 3. dávka po 5 - 12 mesiacoch po 2. očkovaní.

Zrýchlená imunizačná schéma: 2. dávka sa podáva po 14 dňoch po 1. očkovaní a 3. dávka po 5 - 12 mesiacoch po 2. očkovaní.

Po 3. dávke má očakávaná ochrana pretrvávať minimálne 3 roky. Aby sa dosiahla imunita pred začiatkom sezónnej aktivity kliešťov, ktorá je na jar, 1. a 2. dávka sa má prednostne podať v zimných mesiacoch. Za ideálnych okolností sa má očkovacia schéma ukončiť podaním 3. dávky očkovacej látky v rovnakej sezóne kliešťov alebo najneskôr pred začiatkom nasledujúcej sezóny kliešťov

Posilňovacie dávky:

Prvá posilňovacia dávka sa má podať po 3 rokoch po 3. dávke. Následné posilňovacie dávky sa majú podať každých 5 rokov po poslednej posilňovacej dávke.

Predĺženie časového odstavu medzi ktorýmkoľvek dávkami (základnej očkovacej schémy alebo posilňovacích dávok) môže viesť k nedostatočnej ochrane pred infekciou. Avšak v prípade prerušenej očkovacej schémy s aspoň 2 predchádzajúcimi očkovaniami je na pokračovanie v očkovacej schéme postačujúca 1 catch-up (doplňujúca) dávka.

Očkovanie hradí pacient

### **Očkovanie proti ľudskému papilomavírusu HPV ( Gardasil 9, Cervarix)**

Očkovanie pre deti( dievčatá aj chlapcov) od 9 rokov až do dospelosti

Počet dávok: Vek 9 -15 rokov: 2 dávky s odpstupom 6 až 12 mesiacov

Nad 15 rokov 3 dávky v schéme : 2.dávka s odstupom 4 až 10 týždňov po 1.dávke , 3. dávka s 6 až 12 mesiacov po 1. dávke

### **Medzi 12-13 rokom je očkovanie plne hrazené zdravotnými poisťovňami**

Ostatné vekové kategórie hradí pacient.

